





Tableau synthèse de la *Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36)*

| | |
|--|---|
| Que mesure l'outil ? | La qualité de vie liée à la santé |
| Avec quelles clientèles l'outil peut-il être utilisé ? | La SF-36 est une mesure qui peut être utilisée avec les personnes ayant un AVC, mais il n'est pas limité à celles-ci. |
| Est-ce un outil de dépistage ou d'évaluation ? | Évaluation |
|  Temps d'administration | Le SF-36 est considérée comme simple à administrer et il faut en moyenne 10 minutes pour le compléter. |
| Versions | SF-12 ; SF-8, SF-6D |
|  Langues | La SF-36 est disponible en plusieurs langues. Il y a plus de 500 publications qui utilisent les traductions et les adaptations anglaises de la SF-36. Pour plus de renseignements sur la disponibilité des traductions de la SF-36, consultez le www.sf-36.org |



Propriétés psychométriques

| | |
|-------------------------|--|
| Fidélité | <ul style="list-style-type: none"> – Sur 10 études qui ont examiné la cohérence interne de la SF-36, 5 ont relevé une excellente cohérence interne (à l'exception des sous-échelles évaluant le Fonctionnement social dans 3 études et la Santé générale dans 1 étude, jugées adéquates). Deux études ont relevé une cohérence interne allant d'adéquante à excellente. Trois études ont relevé une faible cohérence interne. – Sur 5 études qui ont examiné la fidélité test-retest de la SF-36, 3 ont relevé une fidélité test-retest allant d'adéquante à excellente. Une étude a relevé une fidélité test-retest adéquate ; une a relevé une fidélité test-retest allant de faible à excellente. – Aucune étude n'a examiné la fidélité inter-juges de la SF-36. |
| Validité | <p>Validité de critère : <i>Validité prédictive :</i> Les sous-échelles de la SF-36 se sont révélées être prédictives du décès, des hospitalisations, des consultations médicales et du fardeau de la dépression chez les personnes âgées déprimées.</p> <p>Validité de construit : <i>Groupes connus :</i> Les scores sur la SF-36 ont fait la distinction entre les patients diagnostiqués avec au moins un problème physique chronique et les témoins sains du même âge ; les individus plus vieux que 75 ans et plus jeunes que 75 ans ; les groupes en fonction du contexte (médecine générale versus patients en consultation externe) ; les personnes souffrant de migraines et les témoins ; les groupes en fonction des récentes visites à leur médecin de famille, des séjours des patients hospitalisés et des maladies de longue durée ; les patients ayant subi un AVC et les témoins du même âge et du même sexe qu'eux.</p> <p><i>Validité convergente :</i> Corrélations <u>adéquates</u> entre la sous-échelle de Santé physique de la SF-36 et l'<i>Activities of Daily Living Index</i> ; la sous-échelle de Vie et relations avec les autres de la SF-36 et l'isolement social du <i>Nottingham Health Profile</i> ; la sous-échelle de Santé perçue de la SF-36 et la cote globale de la qualité de vie liée à la santé de l'<i>EuroQol</i> ; la sous-échelle de Douleurs physiques de la SF-36 et tous les domaines de l'<i>EuroQol</i> ; et la sous-échelle de Limitations dues à l'état psychique avec le domaine psychologique de l'<i>EuroQol</i>.</p> <p><u>Excellentes</u> corrélations entre le score de Santé physique de la SF-36 et la <i>Geriatric Depression Scale</i> ; la sous-échelle de Vitalité de la SF-36 et la sous-échelle d'énergie du <i>Nottingham Health Profile</i> ; la sous-échelle de Douleurs physiques de la SF-36 avec le domaine de douleur de l'<i>EuroQol</i>.</p> |
| Effets plancher/plafond | Sur 8 études examinées, 6 études ont relevé que la SF-36 a des effets de plancher et de plafond significatifs, une étude a relevé seulement des effets de plafond significatifs et une étude a relevé seulement des effets de plancher significatifs. |

| | |
|---|---|
| Est-ce que l'outil est sensible aux changements ? | <p>Sur 3 études examinées, une étude a relevé que la SF-36 avait une <u>grande</u> capacité de détecter un changement, une étude a relevé une capacité <u>modérée</u> à <u>élevée</u> de détecter un changement (à l'exception des dimensions de Vie et relations avec les autres et de Santé psychique qui avaient toutes les deux de <u>petits</u> effets de taille) ; une étude a relevé une capacité <u>faible</u> (Limitations dues à l'état psychique, score sommaire de la composante mentale) à <u>élevée</u> (Douleurs physiques, score sommaire de la composante physique) de détecter un changement. À notre connaissance, aucune étude n'a examiné la capacité de la SF-36 de détecter un changement chez les patients ayant subi un AVC.</p> |
| Acceptabilité | <p>La SF-36 ne peut pas être utilisée avec les patients qui ne comprennent pas la langue écrite ou parlée, les patients sévèrement affectés qui ont besoin d'un proche pour compléter le questionnaire ou les patients avec de l'aphasie. À notre connaissance, aucune étude n'a examiné la capacité de la SF-36 de détecter un changement chez les patients ayant subi un AVC.</p> |
|  Faisabilité | <p>La SF-36 est simple à administrer et ne nécessite pas de formation ou d'équipement particulier. Elle convient pour l'auto administration, l'administration informatisée ou l'administration en personne ou par téléphone par un interviewer formé, aux personnes de 14 ans et plus.</p> |
|  Comment obtenir l'outil ? | <p>Toutes les versions de la SF-36 peuvent être consultées en visitant le site web : www.qualitymetric.com</p> |