Prise en charge de la FA aux urgences

(Recommandations SFMU – SFC)

Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)

- Pierre Taboulet, CHU Saint-louis-Lariboisière, Paris
- Olivier Ganansia, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris
- Jonathan Duchenne. Centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac
- Hugues Lefort, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
- Caroline Zanker, Groupe hospitalier HEGP
- Patricia Jabre, SAMU de Paris

Société Française de Cardiologie (SFC)

- Jean-Marc Davy, CHRU Arnaud de Villeneuve, Montpellier
- Jean-Yves Le Heuzey, Cardiologie, Hôpital Georges Pompidou, Paris

Fibrillation atriale

Flutter atrial

T. atriale focale

Tachycardie (jonctionnelle) réciproque

- A. réentrée intranodale
- B. faisceau accessoire

A

B

P. Taboulet

Points forts

Bilan FA

- Réponses aux questions clés +++
- Echographie clinique ++
- Chads₂va₂sc et Has-bled +++

Anticoagulation

- Bénéfice/risque = scores → dossier
- AOD préférence à AVK; HBPM premier jour ? Pas d'aspirine

Ralentir

- Corriger facteurs « adrénergiques »
- Choix de molécule(s) par élimination

Cardioversion

- Organiser/envisager < 48 heures
- Amiodarone IV ou PO (pour CEE et AA classe I, avis cardio)

Bilan clinique : questions clés

Type de FA : inaugurale, paroxystique, persistante ou permanente

Heure de début d'une forme inaugurale ou récidivante

→ possible : nouveaux symptômes (palpitations, vertiges ou douleur thoracique) ou conséquences hémodynamiques brutales (malaise, syncope)

→ impossible si la FA de découverte fortuite ou révélée par une complication

Paramètres vitaux et ECG

Signes d'accompagnement : malaise, dyspnée, douleur thoracique, etc.

Tolérance hémodynamique, respiratoire

Complications thromboemboliques artérielles

Facteur déclenchant (K, sepsis, acidose, toxique, effort...)

Terrain cardiologique et comorbidités

Traitement chronique

Points forts

Bilan FA

- Réponses aux questions clés +++
- **Echographie clinique ++**
- Chads₂va₂sc et Has-bled +++

Anticoagulation

- Bénéfice/risque = scores → dossier
- AOD préférence à AVK; HBPM premier jour ? Pas d'aspirine

Ralentir

- Corriger facteurs « adrénergiques »
- Choix de molécule(s) par élimination

Cardioversion

- Organiser/envisager < 48 heures
- Amiodarone IV ou PO (pour CEE et AA classe I, avis cardio)

- En cas de FA mal tolérée (hémodynamique instable, œdème pulmonaire, douleur thoracique ou choc cardiogénique), il est recommandé qu'une ETT soit réalisée en urgence (ESC, classe I) [ESC 2010].
- Si une ETT n'est pas réalisable, nous recommandons qu'une échocardiographie clinique soit réalisée dans la SU (SFMU/SFC, classe IIa).

Biologie

- Nouvelle FA : K, créatinine, NFS, glycémie
- Orientation clinique : peptides N, d-dimères, toxique...
- ACG d'une FA : hémostase, INR, dosage spécifique

Echographie : ETT ou à défaut échographie clinique

- FA mal tolérée : indispensable (classe I)
- FA bien tolérée, inaugurale ou récidivante : peut faciliter la pec (classe IIa)

RX thorax

- FA inaugurale/récidivante ou mal tolérée : cœur, vx, poumons, plèvres

→ Nous recommandons que le score CHA₂DS₂-VASc d'un patient en FA soit calculé et figure dans le dossier médical lorsqu'un traitement antithrombotique est envisagé ou modifié en médecine d'urgence (SFMU/SFC, classe I).

b) Adjusted stroke rate according to CHA ₂ DS ₂ -VASc score		
CHA ₂ DS ₂ -VASc score	Patients (n = 73538)	Stroke and thromboembolism event rate at 1 year follow-up (%)
0	6369	0.78
1	8203	2.01
<p>Les patients qui ont un score CHA₂DS₂-VASc = 1 ont un bénéfice incertain d'une prévention du risque thromboembolique par antithrombotique.</p> <p>→ En cas de score CHA₂DS₂-VASc = 1, un traitement anticoagulant doit être envisagé, basé sur l'évaluation du risque de complication hémorragique et les préférences du patient (ESC, classe IIa) [Camm 2012]. La décision d'anticoagulation peut être différée jusqu'à l'avis du cardiologue ou du médecin référent (SFMU/SFC classe IIa).</p>		
8	285	22.38
9	46	23.64

→ Nous recommandons que le score HAS-BLED d'un patient en FA soit calculé et figure dans le dossier médical lorsqu'un traitement antithrombotique est envisagé ou modifié en médecine d'urgence (SFMU/SFC, classe IIa).

→ Un score ≥ 3 points indique un « risque élevé » de saignement avec des AVK ou l'aspirine.

Un traitement AVK s'accompagne d'une incidence annuelle d'environ 1,5% patient/année d'hémorragies graves [Pister 2010] et de 0,3 à 0,5 % patient/année d'hémorragies mortelles [Fihn 1996].

Letter	Clinical characteristic	Points awarded	
H	Hypertension	1	
A	Abnormal renal and liver function (1 point each)	1 or 2	Score 0 : 1,1% Score 1 : 1%
S	Stroke	1	Score 2 : 1,9%
B	Bleeding tendency or predisposition	1	Score 3 : 3,7%
L	Labile INRs (if taking VKA)	1	Score 4 : 8,7%
E	Elderly (e.g., age >65, frail condition)	1	Score 5 : 12 %
D	Drugs (concomitant aspirin, NSAID) or alcohol (1 point each)	1 or 2	
		Maximum 9 points	8

Points forts

Bilan FA

- Réponses aux questions clés +++
- Echographie clinique ++
- CHA₂DS₂-VASc et HAS-BLED +++

Anticoagulation

- Bénéfice/risque = scores → dossier
- AOD préférence à AVK; HBPM premier jour ? Pas d'aspirine

Ralentir

- **Corriger facteurs « adrénergiques »**
- **Choix de molécule(s) par élimination**

Cardioversion

- Organiser/envisager < 48 heures
- Amiodarone IV ou PO (pour CEE et AA classe I, avis cardio)

Points forts

Bilan FA

- Réponses aux questions clés +++
- Echographie clinique ++
- CHA₂DS₂-VASc et HAS-BLED +++

Anticoagulation

- Bénéfice/risque = scores → dossier
- AOD préférence à AVK; HBPM premier jour ? Pas d'aspirine

Ralentir

- Corriger facteurs « adrénergiques »
- Choix de molécule(s) par élimination

Cardioversion

- Organiser/envisager < 48 heures
- Amiodarone IV ou PO (pour CEE et AA classe I, avis cardio)

Filière ambulatoire

- La prise en charge ambulatoire d'un patient stable en FA est envisageable lorsque le contrôle de la fréquence cardiaque et l'initiation du traitement anticoagulant ont été réalisés (SFMU/SFC, classe IIa)
- **La cardioversion ambulatoire par amiodarone orale d'un patient stable en FA récente (de moins de 48 heures) est envisageable lorsqu'un traitement anticoagulant a été initié (SFMU/SFC, classe IIa), en conformité avec les objectifs de prise en charge recommandée par l'ESC [ESC 2010].**
- Il est recommandé d'orienter vers un cardiologue tous les patients dont le traitement de la FA inaugurale ou récidivante a été initié ou modifié, dans un délai court et adapté à la situation médicale (SFMU/SFC, classe I).
- Il est souhaitable de disposer d'une filière de soins cardiologiques pour la prise en charge des patients avec FA inaugurale ou récidivante à la sortie de la SU (SFMU/SFC, classe IIa).

Filière ambulatoire

- La prise en charge ambulatoire d'un patient stable en FA est envisageable lorsque le contrôle de la fréquence cardiaque et l'initiation du traitement anticoagulant ont été réalisés (SFMU/SFC, classe IIa)
- La cardioversion ambulatoire par amiodarone orale d'un patient stable en FA récente (de moins de 48 heures) est envisageable lorsqu'un traitement anticoagulant a été initié (SFMU/SFC, classe IIa), en conformité avec les objectifs de prise en charge recommandée par l'ESC [ESC 2010].
- Il est recommandé d'orienter vers un cardiologue tous les patients dont le traitement de la FA inaugurale ou récidivante a été initié ou modifié, dans un délai court et adapté à la situation médicale (SFMU/SFC, classe I).
- **Il est souhaitable de disposer d'une filière de soins cardiologiques pour la prise en charge des patients avec FA inaugurale ou récidivante à la sortie de la SU (SFMU/SFC, classe IIa).**

Points forts

Bilan FA

- Réponses aux questions clés +++
- Echographie clinique ++
- CHA₂DS₂-VASc et HAS-BLED +++

Anticoagulation

- Bénéfice/risque = scores → dossier
- AOD préférence à AVK; HBPM premier jour ? Pas d'aspirine

Ralentir

- Corriger facteurs « adrénérgiques »
- Choix de molécule(s) par élimination

Cardioversion

- Organiser/envisager < 48 heures
- Amiodarone IV ou PO (pour CEE et AA classe I, avis cardio)

Balance bénéfique/risque

b) Adjusted stroke rate according to CHA ₂ DS ₂ -VASc score						
CHA ₂ DS ₂ -VASc score	Patients (n = 73538)	Stroke and thromboembolism event rate at 1 year follow-up (%)				
0	6369	0.78	0,2		1,1	
1	8203	2.01	0,6		1	
2	12771	3.71	1,2		1,9	
3	17371	5.92	2		3,7	
4	13887	9.27	3,1		8,7	
5	8942	15.26	5		12,5	
6	4244	19.74	6,5			
7	1420	21.50				
8	285	22.38				
9	46	23.64				

Cardioversion

→ Un protocole de cardioversion d'une FA de durée de moins de 48 heures chez un patient stable doit être disponible dans chaque SU (SFMU/SFC, classe I).

→ Lorsqu'une cardioversion électrique ou pharmacologique IV d'une FA est envisagée dans le cadre d'une stratégie de contrôle du rythme, une hospitalisation est recommandée (SFMU/SFC, classe I).

→ La réalisation d'une cardioversion électrique ou pharmacologique IV d'une FA est envisageable dans la SU dans le cadre d'une hospitalisation courte (SFMU/SFC, classe IIb).

La cardioversion ambulatoire par **amiodarone orale** d'un patient stable en FA récente (de moins de 48 heures) est envisageable lorsqu'un traitement anticoagulant a été initié (SFMU/SFC, classe IIa)

Filières de soins

- **La prise en charge ambulatoire d'un patient stable** en FA est envisageable lorsque le contrôle de la fréquence cardiaque et l'initiation du traitement anticoagulant ont été réalisés (SFMU/SFC, classe Ia)
- La prise en charge ambulatoire d'un patient stable après cardioversion/conversion est envisageable lorsqu'un traitement préventif des récurrences et un traitement anticoagulant ont été initiés (SFMU/SFC, classe Ia)
- Il est recommandé d'orienter vers un **cardiologue** tous les patients dont le traitement de la FA inaugurale ou récurrente a été initié ou modifié, dans un délai court et adapté à la situation médicale (SFMU/SFC, classe I).
- Il est souhaitable de disposer d'une **filière de soins cardiologiques** pour la prise en charge des patients avec FA inaugurale ou récurrente à la sortie de la SU (SFMU/SFC, classe IIa).